

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 19-3-81 671915

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION « AUVERGNE ET LIMOUSIN »

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DÔME, HAUTE-VIENNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Cité Administrative, rue Pélissier, 63034 Clermont Ferrand Cedex

Téléphone (73) 92-42-68 - Poste 477

ABONNEMENT ANNUEL :

Régie de Recettes de la D.D.A.
Sous Régisseur de Recettes
du Service de la Protection
des Végétaux
Cité Administrative - Rue Pélissier
63034 Clermont Ferrand Cedex
C. C. P. Clermont-Ferrand 5.503-17

BULLETIN N° 175 du 17 MARS.- (Edition Générale 1981 - n° 5)

ARBRES FRUITIERS A PEPINS

TAVELURE DU POIRIER.-

Les ascospores contenues dans les périthèces (forme de conservation hivernale du champignon dans les feuilles tombées à l'automne) arrivent à maturité.

Des attaques peuvent avoir lieu précocement à partir de germes (conidies) issus des pustules chancreuses qui se trouvent sur les rameaux.

Sur les variétés précoces le stade sensible C3 D (boutons floraux commençant à s'ouvrir) va être atteint - région de SAVAT (Puy-de-Dôme).

En conséquence, il est conseillé d'effectuer un traitement fongicide dans les prochains jours.

CULTURES LEGUMIERES

RHIZOCTONE VIOLET SUR ASPERGE.-

La protection des jeunes plants contre ce champignon s'effectue avant plantation en désinfectant les griffes par trempage pendant 15 mn, dans une solution d'eau de Javel à 12° chlorométrique (un sachet de 250 cm³ du commerce à 48°, dans un litre d'eau).

Après désinfection, les griffes doivent être rincées abondamment à l'eau courante et plantées aussitôt.

Parfois le traitement est réalisé par le pépiniériste fournisseur des griffes, dans ce cas, il est inutile de renouveler l'opération.

L'Habillage, pratique qui consiste à couper l'extrémité des racines avant plantation est déconseillée.

Eviter d'effectuer une plantation d'asperges dans des zones où des attaques de la maladie ont été observées les années précédentes sur des cultures sensibles telles que carottes, betteraves, pommes de terre.

Après retournement d'une luzerne, il serait prudent d'implanter une culture sensible pour s'assurer de l'absence de la maladie.


LE CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION
PHYTOSANITAIRE,

A. FARGEIX.

P88

N° d'inscription à la C.P.P.A.P. : 525 AD.

Stades repères du pommier



d'après Fleckinger (INRA).

Stades repères du poirier

